

暗記チェックテスト

成分名	成分のカテゴリ	暗記キーワード
1	(A) 解熱鎮痛	唯一のピリン系
2	(D) 去痰	粘液成分の含量比を調整
3	(K) 粘膜保護修復	体内でトラネキサム酸になる 血栓ある人×
4	(H) 抗めまい	前庭神経の調節 内耳への血流改善
5	(F) 抗ヒスタミン	作用が遅く、持続時間が長い
6	(I) 抗コリン	作用が早く、持続時間が短い 緑内障×
7	(G) 抗炎症	偽アルドステロン症 カンゾウ(生薬) 40mg以上は長期× 1日上限200mg
8	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
9	(A) 解熱鎮痛	胃腸にやさしい 小児OK 抗炎症作用なし
10	(I) 抗コリン	スコポラミンを含む生薬 散瞳 乳児の脈が速くなる(頻脈) 緑内障×
11	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析×
12	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 痛みの伝わりを抑える
13	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 12週以内の妊婦× 抗炎症作用あり
14	(B) 麻薬性鎮咳	【濫用指定成分】 麻薬性 依存 便秘 12歳未満× 妊婦×授乳×運転×
15	(J) アドレナリン作動	【濫用指定成分】 依存性

アセトアミノフェン	合成ヒドロタルサイト	ブソイドエフェドリン塩酸塩
イソプロピルアンチピリン	ジフェンヒドラミン塩酸塩	メチルエフェドリン塩酸塩
イブプロフェン	メクリジン塩酸塩	アルジオキサ
エテンザミド	グリチルリチン酸二カリウム	スクラルファート
コデインリン酸塩	トラネキサム酸	セトラキサート塩酸塩
ジヒドロコデインリン酸塩	ジフェニドール塩酸塩	
エチルシステイン塩酸塩	スコポラミン臭化水素酸塩	
カルボシステイン	ピレンゼピン塩酸塩	
グアイフェネシン	ベラドンナ総アルカロイド	
プロムヘキシシン塩酸塩	ロートエキス	

こたえ

	成分名	成分のカテゴリ	暗記キーワード
1	イソプロピルアンチ ピリン	(A) 解熱鎮痛	唯一のピリン系
2	カルボシステイン	(D) 去痰	粘液成分の含量比を調整
3	セトラキサート塩酸 塩	(K) 粘膜保護修復	体内でトラネキサム酸になる 血栓ある人×
4	ジフェニドール塩酸 塩	(H) 抗めまい	前庭神経の調節 内耳への血流改善
5	メクリジン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	作用が遅く、持続時間が長い
6	スコポラミン臭化水 素酸塩	(I) 抗コリン	作用が早く、持続時間が短い 緑内障×
7	グリチルリチン酸二 カリウム	(G) 抗炎症	偽アルドステロン症 カンゾウ(生薬) 40mg 以上は長期× 1日上限200mg
8	グアイフェネシン	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
9	アセトアミノフェン	(A) 解熱鎮痛	胃腸にやさしい 小児OK 抗炎症作用なし
10	ロートエキス	(I) 抗コリン	スコポラミンを含む生薬 散瞳 乳児の脈が 速くなる(頻脈) 緑内障×
11	合成ヒドロタルサイ ト	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析×
12	エテンザミド	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 痛みの伝わりを抑える
13	イブプロフェン	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 12週以内の妊婦× 抗炎症作用 あり
14	コデインリン酸塩	(B) 麻薬性鎮咳	【濫用指定成分】 麻薬性 依存 便秘 12 歳未満× 妊婦×授乳×運転×
15	メチルエフェドリン 塩酸塩	(J) アドレナリン作 動	【濫用指定成分】 依存性