

暗記チェックテスト

成分名	成分のカテゴリ	暗記キーワード
1	(A) 解熱鎮痛	唯一のピリン系
2	(D) 去痰	粘液成分の含量比を調整
3	(K) 粘膜保護修復	体内でトラネキサム酸になる 血栓ある人×
4	(H) 抗めまい	前庭神経の調節 内耳への血流改善
5	(F) 抗ヒスタミン	作用が遅く、持続時間が長い
6	(I) 抗コリン	作用が早く、持続時間が短い 緑内障×
7	(G) 抗炎症	偽アルドステロン症 カンゾウ(生薬) 40mg 以上は長期× 1日上限200mg
8	(F) 抗ヒスタミン	【指定濫用防止医薬品】 乳汁に移行 乳児昏睡
9	(A) 解熱鎮痛	胃腸にやさしい 小児OK 抗炎症作用なし
10	(I) 抗コリン	スコポラミンを含む生薬 散瞳 乳児の脈が 速くなる(頻脈) 緑内障×
11	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析×
12	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 痛みの伝わりを抑える
13	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 12週以内の妊婦× 抗炎症作用 あり
14	(B) 麻薬性鎮咳	【指定濫用防止医薬品】 麻薬性 依存 便 秘 12歳未満× 妊婦×授乳×運転×
15	(J) アドレナリン作 動	【指定濫用防止医薬品】 依存性

アセトアミノフェン	合成ヒドロタルサイト	ブソイドエフェドリン塩酸塩
イソプロピルアンチピリン	ジフェンヒドラミン塩酸塩	メチルエフェドリン塩酸塩
イブプロフェン	メクリジン塩酸塩	アルジオキサ
エテンザミド	グリチルリチン酸二カリウム	スクラルファート
コデインリン酸塩	トラネキサム酸	セトラキサート塩酸塩
ジヒドロコデインリン酸塩	ジフェニドール塩酸塩	
エチルシステイン塩酸塩	スコポラミン臭化水素酸塩	
カルボシステイン	ピレンゼピン塩酸塩	
グアイフェネシン	ベラドンナ総アルカロイド	
プロムヘキシシン塩酸塩	ロートエキス	

こたえ

	成分名	成分のカテゴリ	暗記キーワード
1	イソプロピルアンチ ピリン	(A) 解熱鎮痛	唯一のピリン系
2	カルボシステイン	(D) 去痰	粘液成分の含量比を調整
3	セトラキサート塩酸 塩	(K) 粘膜保護修復	体内でトラネキサム酸になる 血栓ある人×
4	ジフェニドール塩酸 塩	(H) 抗めまい	前庭神経の調節 内耳への血流改善
5	メクリジン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	作用が遅く、持続時間が長い
6	スコポラミン臭化水 素酸塩	(I) 抗コリン	作用が早く、持続時間が短い 緑内障×
7	グリチルリチン酸二 カリウム	(G) 抗炎症	偽アルドステロン症 カンゾウ(生薬) 40mg 以上は長期× 1日上限200mg
8	ジフェンヒドラミン 塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	【指定濫用防止医薬品】 乳汁に移行 乳児昏睡
9	アセトアミノフェン	(A) 解熱鎮痛	胃腸にやさしい 小児OK 抗炎症作用なし
10	ロートエキス	(I) 抗コリン	スコポラミンを含む生薬 散瞳 乳児の脈が 速くなる(頻脈) 緑内障×
11	合成ヒドロタルサイ ト	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析×
12	エテンザミド	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 痛みの伝わりを抑える
13	イブプロフェン	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 12週以内の妊婦× 抗炎症作用 あり
14	コデインリン酸塩 ジヒドロコデインリン酸塩	(B) 麻薬性鎮咳	【指定濫用防止医薬品】 麻薬性 依存 便 秘 12歳未満× 妊婦×授乳×運転×
15	メチルエフェドリン塩酸塩 ブソイドエフェドリン塩酸塩	(J) アドレナリン作 動	【指定濫用防止医薬品】 依存性